

A close-up photograph of a golden wheat ear in the foreground, with a field of similar wheat stretching into the background. In the distance, a white sign with a blue top bar and the word 'JAKUBUS' in red letters is visible against a backdrop of green trees and a cloudy sky.

JAKUBUS

JAKUBUS (6RZ)

Wzorzec plonowania

Jęczmień ozimy wielorzędowy

www.saaten-union.pl

**SAATEN
UNION**
Züchtung ist Zukunft

Jęczmień ozimy wielorzędowy

JAKUBUS (6RZ) Wzorzec plonowania

Zalety:

- Najwyższy poziom plonowania w doświadczeniach rejestrowych i porejestrowych COBORU
- Typ kompensacyjny, o średniej dojrzałości i dobrej odporności na wyleganie
- Wysoka zimotrwałość
- Bardzo wysoka odporność na wszystkie choroby jęczmienia
- Polecany na wszystkie jęczmienne stanowiska, w szczególności na regiony ze słabszą glebą i trudniejszymi warunkami pogodowymi

Odmiana	n=5	n=2	n=5	n=12
	Północny zachód	Północny wschód	Południe	Średnia
JAKUBUS	109,4	100,5	102,4	105,0
Odmiana konkurencyjna F1	102,8	103,5	102,8	102,9
Wzorzec populacyjny	99,2	97,5	95,2	97,3

Źródło: NL-trials Germany, plon dt/ha poziom a2, 2017



Klasyfikacja*:

- termin kłoszenia 5 (średni)
- termin dojrzewania 5 (średni)
- zimotrwałość 5 (wysoka)
- wysokość roślin 4 (niska do średniej)
- odporność na wyleganie 7 (wysoka)

Struktura plonu:

- potencjał plonu a1 9 (b. wysoki)
- potencjał plonu a2 9 (b. wysoki)
- gęstość łanu 6 (średnia do wysokiej)
- ilość ziaren w kłosie 6 (średnia do wysokiej)
- MTZ 5 (średnia)

Odporność na choroby:

- pleśń śniegowa 8 (wysoka do b. wysokiej)
- mączniak 8 (wysoka do b. wysokiej)
- rynhosporioza 8 (wysoka do b. wysokiej)
- rdza jęczmienia 8 (wysoka do b. wysokiej)
- plamistość siatkowa 8 (wysoka do b. wysokiej)
- ciemnobrunatna plamistość 8 (wysoka do b. wysokiej)

Charakterystyka jakościowa

- zawartość białka 5 (średnia)
- wyrównanie ziarna > 2,2mm 8 (wysoka do b. wysokiej)
- waga 1 hektolitra 5 (średnia)

Termin wysiewu:

- data wrzesień

Gęstość siewu

- wczesny siew 240-260 ziaren/m²
- optimalny siew 260-290 ziaren/m²
- późny siew 290-330 ziaren/m²


Nawożenie azotem:

Dawka powinna zostać dostosowana do stanowiska. Zazwyczaj:

- krzewienie BBCH 21-25 70-90 kg N/ha
- faza strzelania w źdźbło BBCH 30-31 30-50 kg N/ha
- dawka późna BBCH 37-39 40-50 kg N/ha

* wg danych COBORU

Plon ziarna w badaniach PDO COBORU średnia z lat 2016-2018



DYSTRYBUTOR

Więcej informacji na:

www.saaten-union.pl

facebook.com/saatenunionpolska