

Pszenica ozima chlebowa B


TOBAK (B) Pewne plonowanie w całej Europie

Zalety:

- Bardzo wysoki potencjał plonowania – 9/9 punktów wg badań BSA,
- Dobra zimotrwałość i dynamiczny rozwój wiosenny,
- Nadaje się do siewu w monokulturze,
- Bardzo wysokie parametry technologiczne do wyrobu mąki i chleba.



Plonowanie pszenicy chlebowej TOBAK w regionach wg badań rejestrowych COBORU z lat 2011-2013, dt/ha, % wzorca



Klasyfikacja:*

- | | |
|--------------------------|-------------|
| • Termin kłoszenia | 5 (średni) |
| • Termin dojrzewania | 5 (średni) |
| • Zimotrwałość | 3 (średnia) |
| • Wysokość roślin | 5 (średnie) |
| • Odporność na wyleganie | 7 (wysoka) |

Struktura plonu:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| • Potencjał plonu a1 | 8 (wysoki do b. wysokiego) |
| • Potencjał plonu a2 | 8 (wysoki do b. wysokiego) |
| • Gęstość łanu | 6 (średnio-wysoka) |
| • Ilość ziaren w kłosie | 7 (wysoka) |
| • MTZ | 4 (średnio-niska) |

Charakterystyka jakościowa:

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| • Zawartość białka | 5 (średnia) |
| • Wskaźnik sedymentacyjny | 7 (wysoki) |
| • Liczba opadania | 9 (bardzo wysoka) |
| • Wydajność mąki T550 | 5 (średnia) |
| • Objętość chleba ze 100g mąki | 7 (wysoki) |
| • Wodochłonność mąki | 9 (bardzo wysoka) |

Termin wysiewu:

- 15 września do 15 października

Gęstość siewu:

- | | |
|------------------|-------------------------------|
| • wczesny siew | 220-240 ziaren/m ² |
| • optymalny siew | 270-310 ziaren/m ² |
| • późny siew | 310-350 ziaren/m ² |

Nawożenie azotem:

Dawka powinna zostać dostosowana do stanowiska, struktury, rozwoju łanu, odmiany i przeznaczenia ziarna. Zazwyczaj:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| • faza krzewienia BBCH 13-25 | 100-120 kg N/ha |
| • faza strzelania w źdźbło BBCH 29-31 | 50-70 kg N/ha |
| • dawka późna BBCH 39 | 80-90 kg N/ha |

Regulator wzrostu:

stosować zgodnie z zaleceniami firmy chemicznej

Odporność na choroby:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| • Mączniak prawdziwy | 8 (wysoka do b. wysokiej) |
| • DTR | 8 (wysoka do b. wysokiej) |
| • Rdza brunatna | 7 (wysoka) |
| • Septorioza liści | 7 (wysoka) |
| • Fuzarioza kłosów | 8 (wysoka do b. wysokiej) |
| • Choroby podstawy źdźbła | 8 (wysoka do b. wysokiej) |

* Dane wg COBORU

Uwaga! Przedstawione w katalogu charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU, zaś w Niemczech przez BSA, jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców. Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.